

Инструкция по медицинскому применению препарата Оциллококцинум

Регистрационный номер: П N014236/01

Торговое название препарата: Оциллококцинум®

Лекарственная форма: Гранулы гомеопатические

Состав (на одну дозу):

Активные компоненты:

•Anas barbariaelium, hepatic et cordis extractum (анас барбариаэлиум, гепатик эт кордис экстрактум) 200 К - 0,01мл

•Вспомогательные компоненты:

•Сахароза - 850мг

•Лактоза - 150мг

Описание: Белые гранулы почти сферической формы, без запаха, легко растворимые в воде

Фармакотерапевтическая группа: Оциллококцинум - гомеопатическое средство

Показания к применению Оциллококцинума: Грипп легкой и средней степени тяжести, острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Препарат применяется по назначению врача

Способ применения и дозы: Положить под язык содержимое тубы и держать до полного растворения. Для детей: растворить содержимое тубы в небольшом количестве воды и давать с ложечки или с помощью бутылочки с соской. Принимать препарат за 15 мин до приема пищи или час спустя. Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента.

Для профилактики: принимать по 1 дозе 1 раз в неделю в период распространения ОРВИ.

Начальная стадия заболевания: как можно раньше принять 1 дозу, затем при необходимости повторить прием 2-3 раза с интервалом в 6 часов.

Выраженная стадия заболевания: принимать по 1 дозе утром и вечером в течение 1-3 дней.

Побочное действие: На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Возможны аллергические реакции.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами

Особые указания: Если в течение 24 часов симптомы заболевания нарастают, то следует обратиться к врачу. Препарат действует тем быстрее и эффективнее, чем раньше начато лечение - с первых же симптомов заболевания. Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.




Форма выпуска Оциллококцинума: Гранулы гомеопатические. По 1 дозе (1 грамму) гранул в тубе из белого полипропилена с пробкой из полиэтилена. По 3 тубы в блистер из прозрачной полихлорвиниловой термоклейкой пленки, запечатанной бумажной лентой. По 2, 4 или 10 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с заклеивающимся по бокам "язычком".

Условия хранения Оциллококцинума: Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте

Срок годности Оциллококцинума: 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке

Условия отпуска из аптек: Без рецепта врача

Как открывать упаковку Оциллококцинума



1. Вытащить контейнер с 3 дозами из коробки.

2. Нажать на ячейку с прозрачной стороны, чтобы нарушить защиту.

3. Вытащить дозу.

Помните, что лекарственные средства «Лаборатории Буарон», как и любые другие, следует принимать после внимательного ознакомления с инструкцией или консультации врача! Имеются противопоказания!

Самолечение опасно, а информация, представленная на сайте, не является полноценной заменой визита к врачу.

Инструкция по медицинскому применению препарата Гомеостресс

Регистрационный номер: ЛСР-006558/09

Торговое название препарата: Гомеостресс®

Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания гомеопатические.

Состав (на одну таблетку):

Активные компоненты:

- Aconitum napellus (аконитум напеллюс) 0,5 мг
- Belladonna (белладонна) 0,5 мг
- Calendula officinalis (календула официналис) 0,5 мг

- Chelidonium majus (хелидониум майюс) 0,5 мг
- Jequirity (еквирити) 0,5 мг
- Viburnum opulus (вибурнум опулюс) 0,5 мг

Вспомогательные компоненты:

- Сахароза 225 мг
- Лактоза 72 мг
- Магния стеарат 3 мг

Описание: Круглые таблетки двояковыпуклой формы белого цвета, с гравировкой «SEDATIF PC» на одной стороне, без запаха или со слабым запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие

Многокомпонентное гомеопатическое средство, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Показания к применению: Тревожные расстройства, беспокойство, нарушение сна.

Противопоказания: Тревожные расстройства тяжелой степени выраженности. Детский возраст до 3-х лет. Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Применение при беременности и в период лактации

Препарат применяется после консультации с врачом.

Способ применения и дозы: Внутрь. Медленно рассасывать по 2 таблетки 3 раза в день.

Детям до 6 лет перед приемом растворять таблетки в воде. Длительность лечения 7-14 дней по рекомендации врача. Прием препарата не должен превышать двух недель. При этом необходимо консультироваться с врачом в случае, если симптомы усиливаются или не прекращаются после 7 дней лечения.

Побочное действие: На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы. Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

На настоящий момент взаимодействия с другими лекарственными средствами отсутствуют. Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания: Необходимо проконсультироваться с Вашим врачом, если на фоне приема препарата не отмечается никаких улучшений.

При наличии выявленной непереносимости фруктозы, сахарозы или галактозы, синдрома мальабсорбции глюкозы, галактозы или дефицит сахаразы/изомальтазы не следует принимать препарат по причине наличия в его составе сахарозы и лактозы.

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, необходимо учитывать, что каждая таблетка содержит менее 0,02 «хлебных единиц» (ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами
Не влияет.

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 20 таблеток в блистере из пленки ПВХ и лакированной алюминиевой фольги. По 2 блистера (по 20 таблеток) вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель: Лаборатория БУАРОН: 2, авеню де л'Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция.

Место производства: БУАРОН, 2, авеню де л'Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция.

Представитель в России/организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Буарон», Москва, Ул. Долгоруковская д.7.

Тел.: +7 (495) 956 08 10
Факс: +7 (495) 956 08 14